



زچہ اور بچہ نگہداشت
کے لئے ہومیوپیتھی پر
قومی مہم

بچوں میں قبض اور ہومیوپیتھک انتظام

- جیسا کہ اس اعلامیہ میں نشاندہی کی گئی ہے، ادویات کو اسی وقت لینا چاہئے جب کہ ہر دوا کے مقابل بیان کردہ علامت مریض سے میل کھاتی ہیں۔
- لی جانے والی دوا - 40 ساڑھی 3 گولیاں ہر تین گھنٹے پر خشک حالت میں زبان پر سادہ پینے کے پانی میں۔
- دوا کو زبان صاف کرنے کے بعد اور زیادہ بہتر ہے کہ خالی پیٹ لینا چاہئے۔
- اگر 24 گھنٹے کے اندر بہتری آتی ہے تو دوا کو روک دینا چاہئے۔
- دوا لینے کے دوران، اگر مریض میں 24 گھنٹے کے اندر بہتری نہیں آتی ہے یا کسی وقت اس کی صحت بدتر ہو جاتی ہے تو، قریب ترین ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
- ادویات کو تیز خوشبو والی اشیاء جیسے کافور، مینتھول وغیرہ سے دور رکھنا چاہئے۔
- ادویات کو دھوپ کے براہ راست اتصال سے دور، ٹھنڈی، خشک جگہ میں رکھنا چاہئے۔
- ادویات کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا چاہئے۔

کسی بھی سوال کے لئے، براہ کرم رابطہ کریں:
ڈاکٹر آر کے سن پنڈا
ڈپٹی ڈائریکٹر (تجربہ)
ڈائریکٹ آف آئی ایس اے اینڈ ہومیوپیتھی
(ہومیوپیتھک ونگ)

سی ایس سی - III فرسٹ فلور، ملی باک، پریٹ وار روڈ - 110092
تیلیفون: 2240019/20/22: ٹیکس: 22440021
ای میل: ddhomeopathy@yahoo.co.in
ddhomeq@nic.in | ddhomeopathy@yahoocoin
www.homeodelhivgovt.nic.in | www.delhihomeo.com



ڈپارٹمنٹ آف ایروپید، یوگا اینڈ
نچروپیتھی، یونانی، سدھا
اینڈ ہومیوپیتھی (اے وائی یو ایس ایچ)
وزارت برائے صحت اور خاندانی بہبود
حکومت ہند

سپیشل کونسل فار
ریسرچ ان ہومیوپیتھی
(ڈپارٹمنٹ آف اے وائی یو ایس ایچ،
وزارت برائے صحت اور خاندانی بہبود
کی خود مختار تنظیم)



بچوں میں قبض

- قبض اس وقت ہوتا ہے جب پاخانہ کرنا دشوار یا کم ہونے لگتا ہے۔
قبض کے مریض بچے کو مندرجہ ذیل بھی ہو سکتا ہے:
- پیٹ میں درد یا اکڑن
 - سخت پاخانے کی سطح پر خون



- اگر مندرجہ ذیل باتیں پیش آتی ہیں تو
ڈاکٹر سے مشورہ کریں:
- بچے کے پاخانے کے نمونے میں اچانک تبدیلی۔
 - بچے کے پاخانے یا پھلپھل میں خون۔
 - پاخانہ کرتے وقت سیدھی آنت میں یا پیٹ میں درد۔

- مت کریں
- بچے کو ردی غذا نہ کھانے دیں۔
 - بچے کو خالص آنا (میدہ)، شوگر اور کینڈی سے بھر پور غذا
نہ دیں۔
 - بچے کو ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر کے سامنے زیادہ دیر نہ بیٹھنے دیں
کیوں کہ اس سے بچے کی جسمانی سرگرمی میں کمی آتی ہے۔

ہومیوپیتھی کس طرح مدد کر سکتی ہے؟
مندرجہ ذیل شیر خواروں اور بچوں کے قبض کے لئے عام طور پر استعمال ہونے والی ہومیوپیتھک ادویات ہیں۔ یہ صلاح دی جاتی ہے کہ کسی اہل ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کیا جانا چاہئے۔

| ادویات | علامات |
|----------------|--|
| الومینا 30 | <ul style="list-style-type: none"> • شیر خواروں اور بچوں کا قبض - مصنوعی بے بی غذا لینے سے - فارمولا دودھ میں تبدیل کرنے سے • بچے بہت زیادہ کھینچتا ہے، یہاں تک کہ ملائم پاخانہ کرنے میں بھی |
| بروینا البا 30 | <ul style="list-style-type: none"> • خشک، سخت پاخانہ، بہت دنوں تک کوئی حاجت نہیں • تنگ مزاج بچہ • بہت زیادہ پانی پیتا ہے |
| پیرافینم 30 | <ul style="list-style-type: none"> • بچوں میں ضدی قبض • بلا نتیجہ پاخانہ کے لئے اکثر خواہش |



| قبض کے اسباب | کیا کرنا ہے |
|---|--|
| بوتل سے دودھ پینے والے شیر خوار بچوں کو قبض زیادہ اکثر ہوتا ہے۔ | گرم موسم میں بوتل سے دودھ پینے والے بچے کو اضافی سیال اور ماں کا دودھ پینے والے شیر خوار بچوں کو اکثر غذا دیں۔ |
| دودھ چھڑانا (چھاتی کے دودھ سے فارمولا دودھ یا ٹھوس غذا کی طرف) | صحیح تناسب میں فارمولا تیار کریں۔ |
| غذائی ریشے کی کمی | ریشے/موٹے چھوٹے چارے سے بھر پور غذا دیں جیسے مکمل اناج (ججورا) بریڈ اور غلہ، پھل اور ترکاریاں۔ |
| نا کافی سیال کا ادخال | سیال/پانی کا زیادہ ادخال (یومیہ کم سے کم 1-2 لیٹر سیال)۔ |
| خالص شوگر سے بھر پور غذا جیسے خالص آنا، میدہ، سفید بکریڈ، کینڈی اور مٹھائیاں۔ | مکمل اناج والا کھانا اور غلہ دیں جیسے گیہوں یا جئی سے بنا دیا۔ |
| بچے پاخانے کی حاجت کو نظر انداز کرتے ہیں (کھیلنے وقت یا کھجک کی وجہ سے) | یقینی بنائیں کہ بچے پاخانے کی حاجت کو نظر انداز نہیں کرتا ہے اور باقاعدہ طور پر پاخانے کی سیٹ پر بیٹھتا ہے۔ |
| جسمانی سرگرمی کی کمی | جسمانی سرگرمی کی حوصلہ افزائی کریں جیسے دوڑنا، سائیکل چلانا وغیرہ۔ |

ورق کے پچھلے رخ پر دی گئی ہدایات کی تعمیل کریں۔

