


شیر خوار کا پیٹ درد

ہومیوپیتھی کس طرح مدد کر سکتی ہے؟

’طفلی تو لچ‘ کے لئے عام طور پر استعمال ہونے والی ہومیوپیتھک ادویات مندرجہ ذیل ہیں۔ یہ صلاح دی جاتی ہے کہ کسی اہل ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کیا جانا چاہئے۔

علامات	ادویات
- تولچ بسبب - گیس - ٹھنڈ لگنا - غصہ ہونے کے بعد - بچہ تولچ کی وجہ سے پیٹ کی طرف اپنے گھٹنے موڑتا ہے	کولو سائنٹہ 30
- بہت تنگ مزاج بچہ - گرم چہرے اور سرخ گالوں کے ساتھ تولچ - بچہ گود میں رہنا پسند کرتا ہے جس سے اسے آرام ملتا ہے - تپش کی وجہ سے علامات بدتر ہو جاتی ہیں	کیمومیلا 30
- قبض، گیس کی وجہ سے تولچ - اکڑن یا کھینچاؤ والا درد - رگڑنے، گرم سینک سے درد میں آرام ہو گیا	میگنسیسیا فوسفورسیم 30
- دست کے ساتھ تولچ - بچہ سارا دن ٹھیک رہتا ہے لیکن رات میں روتا ہے اور بے چین - ہو جاتا ہے۔	جلاپا 30
- قبض اور ریاح کی وجہ سے تولچ - اشتہا کا فقدان	سینا 30

درد کے پچھلے رخ پر دی گئی ہدایات کی تعمیل کریں۔



بچہ کو ڈاکر کرانے کے طریقے

کریں

- یقینی بنائیں کہ بچہ دودھ پینے وقت ہوا نہیں نگلتا ہے۔
- دودھ پلاتے وقت بچہ کو ڈاکر لائیں۔ بچہ کو کاندھے سے پکڑیں اور اس کی پیٹھ کو تپتھپائیں یا رگڑیں۔
- دودھ پروٹین کی الرجی میں مبتلا بچے کے لئے کم الرجی یا سویا دودھ فارمولا آزمائیں۔

نہ کریں

- دودھ پلانا بند نہ کریں، دودھ چھڑانے سے تولچ بدتر ہو سکتا ہے۔
- تیز شور و غل، چمکدار روشنیوں اور پر شور کھلونوں اور کھڑکھڑانے والے کھلونوں سے پرہیز کریں۔

ڈاکٹر کو دکھائیں اگر بچہ:

- خلاف معمولی طور روتا ہے
- اس کو دیگر علامات ہیں جیسے: بخار، سانس لینے میں دشواری، قے، دست یا بہت زیادہ نیند
- مندرجہ بالا اقدامات سے ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے

شیر خوار قولنج یا بچہ قولنج یا تین مہینے کا قولنج

وہ کیفیت ہے جب کہ پر خور اور صحت مند بچہ لمبے وقفے تک بے قابو ہو کر روتا ہے۔ یہ 3 ہفتے کی عمر سے 4-3 مہینے تک جاری رہتا ہے۔

قولنج مندرجہ ذیل کی وجہ سے واقع ہو سکتا ہے:

- خام ہاضمہ اور عصبی نظام
- کھانوں کے درمیان ٹنگی ہوئی ہوا
- دودھ پروٹین کے لئے الرجی
- قولنج کے ساتھ بچہ**
- لمبے وقفوں تک روتا ہے
- اپنا سر اٹھاتا ہے، اپنی ٹانگیں ناف تک اٹھاتا ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور ہوا خارج کرتا ہے۔
- دودھ لینے سے انکار کرتا ہے
- سونے سے قاصر ہے۔

قولنج زدہ بچے کو ٹھنڈا کرنا:

- بچہ کو سیدھی ٹینٹ میں پکڑیں۔
- بچے کے پیٹ پر گرم تولیہ یا گرم پانی کی بوتل رکھیں (دھیان رہے کہ بچے کی ملائم جلد مل نہ جائے)



بچے کو کھل میں پیٹ دیں

بچے کو چوسنے کے لئے کوئی چیز دیں

پکڑ کر بچے کو جھلائیں

- پانچ چیزوں کی تعمیل کریں:

- بچے کو بوتڑے میں باندھیں یا آرام سے کھل میں لپیٹیں۔
- بچے کو اس کے پھلو یا پیٹ کے بل رکھیں۔



ہومیوپیتھک علاج لینے کے دوران عام ہدایات:

- جیسا کہ اس اعلامیہ میں نشاندہی کی گئی ہے، ادویات کو اسی وقت لینا چاہئے جب کہ ہر دوا کے مقابل بیان کردہ علامت مریض سے میل کھاتی ہیں۔
- لی جانے والی دوا - 40 سائز کی 3 گولیاں ہر تین گھنٹے پر خشک حالت میں زبان پر سادہ پینے کے پانی میں۔
- دوا کو زبان صاف کرنے کے بعد اور زیادہ بہتر ہے کہ خالی پیٹ لینا چاہئے۔
- اگر 24 گھنٹے کے اندر بہتری آتی ہے تو دوا کو روک دینا چاہئے۔
- دوا لینے کے دوران، اگر مریض میں 24 گھنٹے کے اندر بہتری نہیں آتی ہے یا کسی وقت اس کی صحت بدتر ہو جاتی ہے تو، قریب ترین ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔
- ادویات کو تیز خوشبو والی اشیاء جیسے کافور، مینتھول وغیرہ سے دور رکھنا چاہئے۔
- ادویا کو دھوپ کے براہ راست اتصال سے دور، ٹھنڈی، خشک جگہ میں رکھنا چاہئے۔
- ادویات کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا چاہئے۔

کسی بھی سوال کے لئے، براہ کرم رابطہ کریں:

ڈاکٹر آر کے من چنڈا

ڈپٹی ڈائریکٹر (ایچ)

ڈائریکٹ آف آئی ایس ایم اینڈ ہومیوپیتھی

(ہومیوپیتھک ورگ)

سی ایس سی - III، فرسٹ فلور، ملی بلاک، پریٹ ہار، دہلی - 110092

ٹیلیفون: 22440019/20/22 - فیکس: 22440021

ای میل: ddhomeh@nicin .ddhomeopathy@yahoo.co.in

ویب سائٹ: www.homeo.delhigovt.nic.in . www.delhihomeo.com



ڈپارٹمنٹ آف آیورید، یوگا اینڈ نیچروپیتھی، یونانی، سدھا اینڈ ہومیوپیتھی (ایم وائی یو ایس ایچ) وزارت برائے صحت اور خاندانی بہبود حکومت ہند



سپیشل کونسل فار ریسرچ ان ہومیوپیتھی (ڈپارٹمنٹ آف ایم وائی یو ایس ایچ، وزارت برائے صحت اور خاندانی بہبود کی خود مختار تنظیم)

شیر خوار قولنج اور

ہومیوپیتھک

انتظام

